

ANAPOLIS



gezondheid troef, ras
aanbevolen voor IPM
(Livre blanc)

- Het tarweras om je grote oppervlakten mee te zaaien
- Weinig kans op grote problemen met ziektes
- Zeer flexibel in de zaai, kan na alle teelten worden gezaaid!

OORSPRONG

kwaker Nordsaat (D) status D 2013, NL 2014




CYCLUS PLANTONTWIKKELING

oprichten laat
aarvorming halflaat
afrijping halflaat

OPBRENGSTPOTENTIEEL

aren/m²  8
korrels/aar  9
duizendkorrelgewicht  8







LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN

gebaardheid neen
chloortoluron gevoelig
alternativiteit tot eind december
wintervastheid  7
uitstoeling  9
plantlengte gemiddeld
legervastheid  8

KWALITEIT

kwaliteit C
HL-gewicht 79-81
valgetal Hagberg 180- 290
eiwitgehalte 11,5-12,5
Zeleny 15-35
alveogram W 190-240

ZIEKTERESISTENTIE

meeldauw  8
gele roest  9
bruine roest  8
septoria  7
aarfusarium  9
mycotoxines (DON)  9
oranje tarwegalmug niet resistent

CULTUURTECHNIEK

zaaitijdstip Half oktober tot eind december, weinig opbrengstverlies bij latere zaai!
zaaidichtheid Oktober 280 korrels/m², november 350 korrels/m²
bemesting Door het latere oprichten kan de eerste fractie later gegeven worden
groeiregulator 2 maal is aanbevolen
ziektebestrijding T1: aandacht voor eventuele, vroege septoria; T2: best met SDHI (80% aren uit)
In een droog voorjaar is één aarbehandeling voldoende

